



INFORMACJA DLA PACJENTKI/A ORAZ FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA WYKONANIE BIOPSJI TARCZYCY

Nazwisko i imię:

PESEL:

Oddział:

Celem badania jest uzyskanie materiału z guzka tarczycy, które następnie w badaniu mikroskopowym pozwala na ocenę charakteru zmiany stwierdzonej w tarczycy.

Wskazania do biopsji tarczycy:

- obecność w obrębie miększu tarczycy wyczuwalnych guzków,
- wole wieloguzkowe,
- dotykowa bolesność powiększonej tarczycy,
- zmieniona konsystencja powiększonej tarczycy,
- obecność niewyczuwalnych dotykem zmian przekraczających średnicę 1 centymetra wykazanych na badaniu USG,
- obecność guzków odgraniczonych nieostro od otaczającego miększu wykazanych za pomocą USG,

Przeciwwskazania do badania stanowią:

- Zaburzenia krzepnięcia- w tym leczenie przeciwkrzepliwe (Warfin, Sintrom, Syncumar, Acenocumarol).
- Zmiany zapalne na skórze szyi.
- Ostre schorzenie infekcyjne zwłaszcza w obrębie gardła, szyi, głowy i inne ciężkie choroby.
- Brak współpracy ze strony chorego.
- Brak zgody chorego.

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania chorego.

Na badanie należy zgłosić się w wyznaczonym terminie po śniadaniu i przyjęciu typowo przyjmowanych leków.

Badanie to polega na wykonaniu nakłucia cienką igłą zazwyczaj jedno lub dwukrotnie tarczycy pod kontrolą jednocześnie wykonywanego badania ultrasonograficznego. Badanie wykonuje się w pozycji leżącej z koniecznością wstrzymania przetykania śliny przez krótki moment.

Badane wykonywane jest bez znieczulenia; znieczulenie jest zbędne, gdyż dyskomfort związany z nakłuciem cienką igłą jest niewielki.

Po wykonaniu biopsji należy stosować nieznaczny ucisk w miejscu nakłucia przez ok. 15 min, opatrunek można usunąć po godzinie.

Możliwe powikłania po biopsji:

- Ból w miejscu nakłucia.
- Krwiak w miejscu nakłucia.



