



**O d d z i a ł O n k o l o g i i K l i n i c z n e j z
P o d o d d z i a ł e m D z i e n n e j C h e m i o t e r a p i i**

Ul. J.Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

Kierownik: (095) 7331-283; telefon do lekarzy (095) 7331-516; pielęgniarki : (095)7331-744;
telefon dostępny dla pacjentów: (0-95) 803-23-46

**ZGODA NA LECZENIE PREPARATEM FULWESTRANT
INFORMACJA DLA PACJENTA**

W oparciu o wykonane badania diagnostyczne rozpoznano u Pani chorobę nowotworową wymagającą leczenia hormonalnego z wykorzystaniem preparatu fulwestrant. W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i podpisanie zgody na leczenie.

Podstawowe metody leczenia nowotworów to: chirurgia, radioterapia, chemioterapia, hormonoterapia i immunoterapia. Niekiedy metody te stosowane są pojedynczo, czasami wykorzystuje się kilka z powyższych metod. Hormonoterapia w tym z zastosowaniem preparatu fulwestrant jest rodzajem leczenia systemowego.

Fulwestrant jest lekiem hormonalnym stosowanym do leczenia raka piersi z obecnymi receptorami estrogenowymi, miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, u kobiet po menopauzie, w przypadku, gdy nastąpił nawrót choroby podczas lub po zakończeniu leczenia uzupełniającego lekiem z grupy antyestrogenów lub, gdy nastąpiła progresja choroby podczas leczenia lekiem z grupy antyestrogenów. Zalecana dawka leku to 500 mg, podawana w odstępach jednomiesięcznych z dodatkową dawką 500 mg po upływie 2 tygodni od podania pierwszej dawki. Fulwestrant podawany jest powoli (czas jednego wstrzyknięcia 1-2 minuty), domięśniowo w dwóch kolejnych wstrzyknięciach po 5 ml, każde w inny pośladek.

Podczas leczenia chorych na nowotwory mogą występować różnego rodzaju dolegliwości i objawy, które mogą być spowodowane przez chorobę lub leczenie. Każdy rodzaj leczenia wpływa nie tylko na komórki nowotworu, ale również na zdrowe komórki i tkanki organizmu. Objawy obserwowane u chorych podczas leczenia, które można wiązać z przyjmowanymi lekami, nazywa się działaniami niepożądanymi. U chorych leczonych takim samym lekiem nie zawsze występują identyczne działania niepożądane

Podczas stosowania leku fulwestrant, podobnie jak podczas stosowania innych leków mogą wystąpić takie działania uboczne. Do najczęściej obserwowanych należą: odczyny w miejscu podania leku (przemijający ból i stan zapalny w miejscu podania), uderzenia gorąca, dolegliwości żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka i brak łaknienia), wysypka skórna, zakażenia dróg moczowych, ból głowy, bóle pleców, krwawienia z pochwy, nadkażenia grzybicze pochwy, obfite białe upławy, reakcje nadwrażliwości (uczulenia).

Wszystkie opisane objawy uboczne mają najczęściej charakter przejściowy i obecnie większości z nich można skutecznie zapobiegać lub leczyć jeśli wystąpią.

ZGODA NA LECZENIE

Oświadczam że zapoznałem/-am się i zrozumiałem/-am powyższą informację dla pacjenta.

Lekarz prowadzący Dr.....udzielił mi wszelkich dodatkowych wyjaśnień, miałem/-am możliwość zadawania pytań i na wszystkie uzyskałem/-am wyczerpujące odpowiedzi.

Moim podpisem poniżej potwierdzam, iż

wyrażam zgodę na proponowane mi leczenie preparatem FULWESTRANT

.....
Data i podpis pacjenta

.....
Podpis lekarza uzyskującego zgodę