



Pobranie moczu od małych dzieci

Dotyczy osoby pobierającej

Dziecko należy rozebrać od pasa w dół w ciepłym pomieszczeniu (najlepiej rano po karmieniu).

Osoba pobierająca mocz musi dokładnie umyć ręce wodą i mydłem, a następnie osuszyć je jednorazowym ręcznikiem.

Nóżki dziecka należy rozchylić, dokładnie umyć okolice cewki moczowej, sromu i odbytu (zawsze do tyłu), także fałdy skórne czterokrotnie zmieniającymi gazikami. Osuszyć jednorazowym ręcznikiem od przodu ku tyłowi.

Należy postarać się aby dziecko oddało mocz bezpośrednio do jałowego pojemnika, przepuszczając pierwszą niewielką porcję moczu w celu „wypłukania” cewki moczowej z bakterii i nabłonków.

Pobranie moczu od noworodków, niemowląt

Dotyczy osoby pobierającej (najlepiej dwie, trzy osoby).

Noworodka/ niemowlę należy napić.

Po 25 minutach od wypicia płynu przez dziecko należy dokładnie umyć okolice cewki moczowej dziecka ciepłą wodą z mydłem i wysuszyć sterylną gazą.

Następnie należy przygotować jałowy pojemnik.

Osoba pobierająca mocz musi dokładnie umyć ręce wodą i mydłem, a następnie osuszyć je jednorazowym ręcznikiem.

Jedna osoba powinna złapać dziecko pod pachami i unieść je.

Druga osoba powinna rozpocząć stymulację pęcherza moczowego dziecka przez delikatne uciśnięcia w strefie nadłonowej z szybkością 100/minutę przez 30 sekund.

Następnie powinna stymulować przykregową strefę lędźwiową (w dolnej części pleców) poprzez delikatne masowanie ruchem kołowym przez 30



sekund.

Stymulację należy powtarzać do momentu mikcji.

Z chwilą rozpoczęcia oddawania moczu, osoba druga powinna rozchylić nóżki dziecka, natomiast osoba trzecia powinna rozchylić wargi sromowe u dziewczynek/ podciągnąć napletek u chłopców i podstawić przygotowany jałowy pojemnik.

Przepuszczając pierwszą niewielką porcję moczu należy pobrać około 5 ml moczu na badanie bakteriologiczne.

Pobranie moczu od noworodków, niemowląt, małych dzieci do woreczków.

Nie jest zalecane.

Jałowy pojemnik

